

ଜୀବାଣୁସାର:



କେତେକ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ଜୀବାଣୁ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପଯୋଗ କମିବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହି ଜୀବାଣୁ ସାର ଗଛର ଖାଦ୍ୟସାର ଯୋଗାଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜୀବାଣୁ ସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଯଥା- ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର ଓ ଫସ୍ତରସ୍ ସାର ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର ।

ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର:



ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା- ଭାଲିଜାଟାୟ ଫସଲ ପାଇଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ଓ ଅଣଭାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଆଜୋସିରିଲମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ବ୍ରବହାର କରାଯାଏ ।

ଫସ୍ତରସ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର:



ବାସିଲସ୍ ଓ ସ୍ପୋଟୋମୋନାସ୍ ଆଦି ଫସ୍ତୋ ବ୍ୟାକ୍ଟର ଜାତିର ଜୀବାଣୁ ସାର ମାଟିରେ ଥିବା ଫସ୍ତରସ୍‌କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାରକୁ ମଞ୍ଜି ଚାରା ଗଛ ଓ ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଜୀବାଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ:



- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଶେଷ ତାରିଖ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ।
- ଜୀବାଣୁସାର ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଚାରା ବିଶୋଧନର ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜମିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ମାଟିରେ ଯଦି ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି ତେବେ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ବିହନ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ନୀଳରହିତ ଶୈବାଳ:



ନୀଳରହିତ ଶୈବାଳ ବା ବି.ଜି.ଏ. ଏକ ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ । ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହାକୁ କେବଳ ଧାନ ଚାଷରେ ଜୈବସାର ରୂପେ ବ୍ରବହାର କରାଯାଏ ।

ଆଜୋଲା:



ଧାନ ଫସଲରେ ଆଜୋଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସାର ଭାବେ ବ୍ରବହାର କରାଯାଏ । ଧାନ ରୋଇବାର ୩-୪ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ କି.ଗ୍ରା. କଞ୍ଚା ଆଜୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହା ୫ ସପ୍ତାହ ପରେ ୩ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୫-୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଧାନ ଫସଲକୁ ମିଳିଥାଏ ।

କୃଷି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଳିଦାନ । ଏଣୁ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ମାଟି ମା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ମାନବ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ।



ସୌଜନ୍ୟ: ଚଲେ ଚଲୋ,
ରଘୁନାଥପୁର ଜଳି, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପିନ୍: ୭୫୪୦୦୫

ଜୈବିକ ଚାଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲାଭ





ଜୈବିକ ତାଷ କ'ଣ ?



ଆଗକାଳରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାରର ତାଷକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ହିଁ ଜୈବିକ ତାଷ । କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଫସଲ ତାଷ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ଜୈବିକ ତାଷ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି କରାଯାଉଥିବା ତାଷ ହିଁ ଜୈବିକ ତାଷ ଅଟେ ।

ଜୈବିକ ତାଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ



- ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
- ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଦା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ
- ସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା



- ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୁବିନିଯୋଗ, ରୋଗଯୋକର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା

ଜୈବିକ ତାଷ ଉପକାରିତା



- ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି । ଏହା ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖୁଥାଏ ।
- ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମାଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ାଇଥାଏ ।
- ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ । ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
- ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖୁଥାଏ । ଉନ୍ନତମାନ, ସ୍ବାଦ ତଥା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୃଷ୍ଠିକର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।



ଜୈବିକ ସାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆଖତ, ସବୁଜସାର, ଜୀବାଣୁସାର, ନୀଳରହିତ ଶୈବାଳ ଓ ଆଜୋଲା ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ । ସେହିପରି ବୃକ୍ଷଜାତ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଧୂଆଁପତ୍ର, ବେତା, ନିମ୍ବ, ବିଲାତି ନିମ୍ବ, ନାଗଆରୀ, ବେଗୁନିଆ, ଅରଖ, ଗଙ୍ଗାଶିଉଳି, ବେଲ, ତୁଳସୀ, ସଦାବିହାରୀ, ରସୁଣ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ । ବିଭିନ୍ନ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକକୋଗାମୀ, ବ୍ରାକନ, ଗୋନିଅଜସ୍ ଆଦି କୀଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବୁଡ଼ିଆଣୀ, କଙ୍କି, ଶିକାରୀ ଜନ୍ତା, ଭାହାଣୀ ପୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରଗୋପା ଭୁଜା, ଆତତାୟୀ ପୋକ, ଶିକାରୀ ଝିଣ୍ଟିକା ଆଦି ପରଭୋଜୀ କୀଟଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କମ୍ପୋଷ୍ଟ:



ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସଢ଼ିବା ଦ୍ବାରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ଯେଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ସେସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଏହି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଏ । କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ପତ୍ର, ଛୋଟଛୋଟ ଡାଳ, ଲତା,



କୁଟା, ଫସଲର ବଳକା ଅଂଶ, ଅଳିଆ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଜିଆଖତ:



ଏହି ଜିଆଖତ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କମ୍ପୋଷ୍ଟ



ଯାହା ଜିଆଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଚୋପା, ଘାସ, ସଡ଼ା ଗୋବର ଆଦି ଜିଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସେମାନେ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ଖାଇ ଜିଆଖତ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଜିଆଖତରେ ସାଧାରଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ ।

ସବୁଜ ସାର:



ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ବୁଣିବା ଓ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧଣିଚା, ବରଗୁଡ଼ି, ଛଣପଟ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଖେସାରି ଆଦି ଭଳି ଫସଲକୁ କଅଁଳ ସବୁଜ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁଜ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଏ । ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ ଧଣିଚା, ମୁଗ, ବିରି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୦-୪୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ପହିଲି ବର୍ଷରେ ଜମି ହଳ କରି ବୁଣି ଦିଆଯାଏ । ଗଛ ୪୦-୫୦ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ବିଲରେ ୫-୧୦ ସେ.ମି. ପାଣି ରଖି ଏହାକୁ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେହିପରି ଅଣତାଳି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା- ସୁବାକୁଳ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ଅଗସ୍ତି ଆଦି ଗଛର ପତ୍ରକୁ କାଟିଆଣି ଏକର ପ୍ରତି ୪-୫ ଟନ୍ ଜମିରେ ପକାଇ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହାକୁ ପତ୍ରସାର କୁହାଯାଏ । ଏହି ସବୁଜ ସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଜମିକୁ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଳିଥାଏ ।

